

## McGivney (Elastik) behandling af Hæmorider

Langt de fleste hæmorider kan behandles med elastikker også kaldet ligaturer. Behandlingen tager få minutter. Ligaturerne påsættes slimhinden i endetarmen, 3-4 cm fra lukkemusklen. Gennem et 10 cm langt rør (anoskop) sættes en lille sugekop på slimhinden. Slimhinde i en mængde svarende til en ært, suges ind i sugekoppen. En lille elastik skydes ned over slimhinden som på denne måde berøves sin blodforsyning, visner og falder af sammen med elastikken efter 5 – 14 dage.

Der kan opstå en lille blødning i forbindelse hermed. Ved behandlingen produceres et ar der som en punktsvejsning lodder slimhinden til tarmens muskulatur. Der sættes 1 eller 2 ligaturer pr. behandling.

Behandlingen er sjældent smertefuld. De fleste beskriver fornemmelsen som "afførings trykken".

Behandlingen skal ofte gentages efter nogle år.

### Forberedelse

Ligaturer kan ikke placeres i en afføringsfyldt tarm. Endetarmen er normalt tom.

### Kontakt

Er der spørgsmål i øvrigt, ring da på klinikken - 39 64 01 25 – i telefontiden mandag til torsdag klokken 9-12 og 13-14.

Eller benyt e-mail [mail@kirurgen.dk](mailto:mail@kirurgen.dk).